


¿Podrías beneficiarte al tomar **Aspirina** durante el embarazo?

Por favor, lee y marca las casillas de abajo para determinar si podrías beneficiarte de la aspirina.

- ¿Has tenido preeclampsia antes (también conocida como toxemia)?
- ¿Estás embarazada de gemelos o trillizos?
- ¿Tienes presión arterial alta (también conocida como hipertensión)?
- ¿Tienes diabetes tipo 1 o tipo 2?
- ¿Tienes problemas con tus riñones?
- ¿Tienes una enfermedad autoinmunitaria como artritis reumatoide o lupus?
- ¿Tienes una condición llamada síndrome antifosfolípido o anticardiolipina?
- ¿Tu madre o hermana ha tenido preeclampsia antes (también conocida como toxemia)?
- ¿Tienes un peso muy elevado (índice de masa corporal de 30 o más)?
- ¿Tienes 35 años o más?
- ¿Naciste con un peso menor a 5.5 libras (2.5 kg)?
- ¿Tienes ascendencia negra, africana o afrocaribeña?
- ¿Será esta la primera vez que tengas un bebé?
- ¿Tu hijo más joven tiene 10 años o más?
- ¿Has tenido un bebé que pesó menos de 5.5 libras (2.5 kg) al nacer?

Si marcó una o más casillas, hable con su proveedor para ver si la aspirina es adecuada para usted.

Gire la página para aprender sobre los beneficios de la aspirina durante el embarazo.



¿Podrías beneficiarte al tomar **Aspirina** durante el embarazo?


¿POR QUÉ ASPIRINA?

- La aspirina de baja dosis, también conocida como aspirina para bebés, ha demostrado que puede disminuir las posibilidades de desarrollar una condición llamada preeclampsia y reduce el riesgo de tener a su bebé demasiado pronto.
- La preeclampsia es un aumento repentino de la presión arterial que ocurre después de la semana 20 del embarazo.
- La preeclampsia puede aumentar el riesgo de tener a su bebé prematuramente (antes de las 37 semanas).
- La preeclampsia puede dañar tu salud al afectar tu corazón, riñones y hígado, y puede causar convulsiones o la muerte a muerte.
- La aspirina en dosis bajas funciona para aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos que llevan a la placenta y mejora el flujo sanguíneo hacia el bebé.

¿CÓMO DEBO TOMAR LA ASPIRINA?

- Si tú y tu proveedor de atención médica deciden que la aspirina es adecuada para ti, comenzarás a tomar una aspirina de baja dosis diaria tan pronto como estés en la semana 12 de embarazo. El uso de la aspirina es más efectivo cuando se comienza entre las semanas 12 y 28 de embarazo.
- Es recomendable tomar una aspirina de baja dosis todos los días, antes de acostarte, hasta que nazca tu bebé.
- Tu médico puede recetarte una aspirina de baja dosis o puedes comprarla sin receta en tu farmacia local.

Aprende más:



www.preeclampsia.org/aspirina